

# La entrevista de diagnóstico CARLOS (CRAFFT)

**Inicio: “Le voy a hacer algunas preguntas que le hago a todos mis pacientes. Le agradezco que responda con la mayor sinceridad posible. Trataré sus respuestas de manera confidencial.”**

## Parte A

**Durante los ÚLTIMOS 12 MESES:**

**No Sí**

1. ¿Ha consumido bebidas alcohólicas (más de unos pocos sorbos)? (Sin tomar en cuenta sorbos de bebidas alcohólicas consumidas durante reuniones familiares o religiosas)

2. ¿Ha fumado marihuana o probado hachís?

3. ¿Ha usado algún otro tipo de sustancias que alteren su estado de ánimo o de conciencia?

(El término “algún otro tipo” se refiere a drogas ilícitas, medicamentos de venta libre o de venta con receta médica, así como a sustancias inhalables que alteren su estado mental.)

**Para uso exclusivo del personal médico: ¿Respondió el paciente “sí” a cualquiera de las preguntas de la Parte A?**

**No**



**Pasar a la pregunta B1 solamente**

**Sí**



**Pasar a las 6 preguntas CARLOS**

## Parte B

**No Sí**

1. ¿Ha viajado, alguna vez, en un CARRO o vehículo conducido por una persona (o usted mismo/a) que haya consumido alcohol, drogas o sustancias psicoactivas?

2. ¿Le han sugerido, alguna vez, sus AMIGOS o su familia que disminuya el consumo de alcohol, drogas o sustancias psicoactivas?

3. ¿Ha usado, alguna vez, bebidas alcohólicas, drogas o sustancias psicoactivas para RELAJARSE, para sentirse mejor consigo mismo o para integrarse a un grupo?

4. ¿Se ha metido, alguna vez, en LÍOS o problemas al tomar alcohol, drogas o sustancias psicoactivas?

5. ¿Se le ha OLVIDADO, alguna vez, lo que hizo mientras consumía alcohol, drogas o sustancias psicoactivas?

6. ¿Alguna vez ha consumido alcohol, drogas o alguna sustancia psicoactiva mientras estaba SOLO o SOLA, sin compañía?

### NOTA SOBRE EL CARÁCTER CONFIDENCIAL DE LA INFORMACIÓN:

La información incluida en esta página puede estar protegida por normas federales sobre confidencialidad (42 CFR Parte 2) que prohíben su divulgación, a no ser que medie una autorización escrita para el caso específico. NO basta con que se cuente con una autorización generalizada en materia de divulgación de la información médica.


© CHILDREN'S HOSPITAL BOSTON, 2009. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Reproducción autorizada por el Center for Adolescent Substance Abuse Research, CeASAR, Children's Hospital Boston. ([www.ceasar.org](http://www.ceasar.org))

## INSTRUCTIVO DE PUNTUACIÓN: PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL MÉDICO

Puntuación de las preguntas CARLOS: Cada respuesta afirmativa ("sí") en la **Parte B** vale 1 punto. Una puntuación total mayor a 2 puntos equivale a un diagnóstico positivo, lo cual indica la necesidad de realizar una evaluación adicional.

### Probabilidad de un diagnóstico de abuso/dependencia del alcohol o de sustancias psicoactivas basado en la puntuación CARLOS<sup>1,2</sup>



#### Criterios de diagnóstico DSM-IV<sup>3</sup> (abreviados)

##### Abuso del alcohol o de sustancias psicoactivas (1 ó más de los siguientes factores):

- Su uso conlleva a un incumplimiento de sus obligaciones laborales, escolares o domésticas
- Uso recurrente en situaciones riesgosas (por ejemplo, conducir)
- Recurrencia de problemas legales
- Continuación de su uso a pesar de la recurrencia de problemas asociados

##### Dependencia de sustancias psicoactivas (3 ó más de los siguientes factores):

- Tolerancia
- Síndrome de abstinencia
- Consumo de la sustancia en cantidades cada vez mayores o durante un período de tiempo mayor al estimado
- Esfuerzos fallidos de reducir o abandonar el consumo de la sustancia
- Una gran cantidad de tiempo invertido en obtener la sustancia o en recuperarse de sus efectos
- Abandono de actividades importantes debido al uso de la sustancia
- Uso continuado a pesar de sus consecuencias nocivas

© Children's Hospital Boston, 2009. Reproducción exacta del presente formulario en entornos médicos autorizada por el Center for Adolescent Substance Abuse Research, Children's Hospital Boston, 300 Longwood Ave, Boston, MA 02115, U.S.A., (617) 355-5433, [www.ceasar.org](http://www.ceasar.org).

#### Citas:

1. Knight JR, Shrier LA, Bravender TD, Farrell M, Vander Bilt J, Shaffer HJ. A new brief screen for adolescent substance abuse [Un nuevo procedimiento breve para diagnosticar el abuso de sustancias en los adolescentes]. Arch Pediatr Adolesc Med 1999;153(6):591-6.
2. Knight JR, Sherritt L, Shrier LA, Harris SK, Chang G. Validity of the CRAFFT substance abuse screening test among adolescent clinic patients [Validez de la prueba diagnóstica del abuso de sustancias CRAFFT en pacientes adolescentes en clínica]. Arch Pediatr Adolesc Med 2002;156(6):607-14.
3. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fourth edition, text revision [Manual de diagnósticos y estadísticas de los trastornos mentales, cuarta edición, texto corregido]. Washington DC, American Psychiatric Association, 2000.